

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Wągrowcu informuje o możliwości sprawdzania komunikatów rolniczych na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Internetowym Systemie Sygnalizacji Agrofagów pod adresem <http://piorin.gov.pl/sygn/start.php>



ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W RZEPAKU OZIMYM

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Chowacz podobnik

Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-13

Szczegóły:

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono występowanie chowacza podobnika – szkodnika łuszczycowego

Zalecenia:

Zwalczanie chowacza podobnika na plantacjach rzepaku należy wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. W przypadku masowego występowania szkodnika zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 4 chrząszcze na 25 roślinach. Zaleca się opryskiwanie plantacji stosując jeden z przykładowych preparatów

Środki ochrony roślin:

BULLDOCK 025 EC
DECIS 2,5 EC
DECISTAB TB
FASTAC 100 EC
FURY 100 EW

KARATE 025 EC
(w obrocie do 04.06.2008 r.)
KARATE ZEON 050 CS
KARATE ZEON 100 CS
(w obrocie do 04.06.2008 r.)
MAVRIK 240 EW

PATRIOT 100 EC
PATRIOT 2,5 EC
RIPCORDER SUPER 050 EC
SUMI – ALPHA 050 EC
TALSTAR 100 EC

Uwagi:

1. Środki działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20 stopni C
2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl >Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin
4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Pryszczarek kapustnik

Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-15

Szczegóły:

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono występowanie pryszczarka kapustnika – szkodnika łuszczynowego

Zalecenia:

Zwalczanie pryszczarka kapustnika na plantacjach rzepaku należy wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. W przypadku masowego występowania szkodnika zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 1 muchówka na 3-4 rośliny. Wartością progową jest też stwierdzenie średnio 5 uszkodzonych przez pryszczarka kapustnika łuszczyn na 1 roślinie. Zaleca się opryskiwanie plantacji stosując jeden z przykładowych preparatów

Środki ochrony roślin:

BULLDOCK 025 EC DECIS 2,5 EC DECISTAB TB FASTAC 100 EC FURY 100 EW KARATE 025 EC (w obrocie do 04.06.2008 r.)	KARATE ZEON 050 CS KARATE ZEON 100 CS (w obrocie do 04.06.2008 r.) MAVRIK 240 EW PATRIOT 100 EC PATRIOT 2,5 EC RIPCORDER SUPER 050EC	SUMI – ALPHA 050 EC TALSTAR 100 EC
---	--	---------------------------------------

Uwagi:

1. Środki działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20 stopni C.
2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl >Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin
4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

Roślina: Rzepak ozimy

Agrofag: Czerń krzyżowych

Data rozpoczęcia zabiegów: 2008-05-15

Szczegóły:

Plantacjom rzepaku ozimego zagrażają choroby grzybowe tj. czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń.

Zalecenia:

Zabiegi należy wykonywać od fazy zwanego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych, a w przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych termin zabiegu można opóźnić do fazy wykształcania pierwszych łuszczyń rzepaku (4-8 łuszczyń na roślinie). Aby zapobiec stratom plonu zaleca się przystąpić do wykonania zabiegu - zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Listę przykładowych środków zamieszczono w poniższej tabeli:

Środki ochrony roślin:

AMISTAR 250 SC * ATAK 450 EC (w obrocie do 26.09.2008 r.) BRASIFUN 250 EC CARAMBA 60 SL EMINENT STAR 312 SE FUKARB 500 SC * (w obrocie do 31.07.2008 r.) HORIZON 250 EW IMPACT 125 SC KONKER 415 SC (w obrocie do 30.10.2008 r.)	MIRAGE 450 EC (w obrocie do 31.07.2008 r.) ORIOUS 250 EW PROKARB 380 EC PROLINE 250 EC (w obrocie do 30.06.2009 r.) ProRok 450 EC RIZA 250 EW * ROVRAL FLO 255 SC SARFUN 500 SC * SPARTA 250 EW *	SPORTAK ALPHA 380 EC (w obrocie do 31.07.2008 r.) SPORTAK 450 EC STOPER 500 SC (w obrocie do 30.08.2008 r.) SUMI-PRO 500 SC (w obrocie do 31.07.2008 r.) TEBU 250 EW TOPSIN M 70 WP * TOPSIN M 500 SC * TRAPER 250 EC
---	---	---

Uwagi:

1. Ww. środki zwalczają także zgniliznę twardzikową (z wyj. oznaczonych *) oraz szarą pleśń.
2. Środek Sumi-Pro 500 SC stosować w mieszaninie z fungicydem Topsin M 500 SC.
3. Stosowanie preparatów triazolowych wpływa na usztywnienie łodyg przez co zmniejsza się ryzyko wylegania.
4. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczy miodnej) i karencji.
5. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl >Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin
6. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].